

OFTALMOL GENTA

GENTAMICINA 3 mg/mL

Solución Oftálmica Estéril
ANTIBIÓTICO

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Gentamicina (como Sulfato de Gentamicina)	3,00 mg
Alcohol Bencílico.....	4,00 mg
Cloruro de Benzalconio.....	0,11 mg
Otros Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPEUTICA

OFTALMOL GENTA contiene **Gentamicina**, antibiótico aminoglucósido que se transporta en forma activa a través de la membrana bacteriana, se une a una proteína receptora específica en la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos e interfiere el complejo de iniciación entre el ARNm y la subunidad 30S, inhibiendo la síntesis proteica. La lectura errónea del ADN da lugar a la producción de proteínas no funcionales, los polirribosomas se separan y son incapaces de sintetizar proteínas.

INDICACIONES

Está indicado en el tratamiento de: blefaritis bacteriana, blefarokonjuntivitis, conjuntivitis bacteriana, dacriosisitis, queratitis bacteriana, queratoconjuntivitis bacteriana y meibomianitis aguda producidas por estafilococos coagulasa-negativos y coagulasa-positivos de *Pseudomonas aeruginosa*, especies indol-positivas e indol-negativas de *Proteus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *H. aegyptius*, *Enterobacter aerogenes*, *Moraxella lacunata* y especies de *Neisseria*, incluyendo *N. gonorrhoeae*.

OFTALMOL GENTA también puede usarse en la prevención de la infección ocular después de la extracción de cuerpos extraños de la córnea o de la conjuntiva, después del traumatismo producido por agentes químicos o físicos y en el pre y post-operatorio de la cirugía ocular.

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Oftálmica

POSOLÓGIA Y MODO DE USO

Infecciones leves o moderadas: Instilar 1 gota cada 4 horas en cada ojo afectado. Infecciones graves: Instilar 1 gota cada hora en cada ojo afectado. Una vez abierto el frasco utilizarlo en el plazo de los 28 días siguientes.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran".

REACCIONES ADVERSAS

Ardor e irritación ocular en el momento de la administración, conjuntivitis inespecífica, lesiones del epitelio conjuntival e hiperemia conjuntival.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se ha reportado alergia cruzada entre aminoglucósidos por lo que los pacientes sensibles a un aminoglucósido pueden serlo también a otros aminoglucósidos.

No debe administrarse mediante inyección subconjuntival ni mediante inyección directa en la cámara anterior del ojo. El uso

tópico prolongado de antibióticos puede provocar crecimiento de microorganismos no susceptibles y hongos. Si esto se presenta o si se observa irritación o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto, se deberá discontinuar su uso e instituir el tratamiento adecuado. No se ha establecido la seguridad de éste durante el embarazo y lactancia, por lo que se deberá observar con especial cuidado cuando se administre a mujeres embarazadas o en período de lactancia. Este medicamento por contener Cloruro de Benzalconio como excipiente puede decolorar los lentes de contacto blandos.

DEPENDENCIA

No se tienen referencias de que las drogas produzcan dependencias en los pacientes tratados con la misma.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la **Gentamicina** o a cualquiera de los componentes de la formulación. Este producto contiene Cloruro de Benzalconio por lo que no se recomienda el uso de lentes de contacto blando durante el tratamiento con este producto.

INTERACCIONES

El uso concomitante de corticoesteroides y **Gentamicina** puede llegar a enmascarar los signos y síntomas clínicos de infecciones por bacterias, virus y hongos o llegar a suprimir las reacciones de hipersensibilidad del antibiótico o a otros componentes de la formulación.

SOBREDOSIS

En el eventual de los casos se observan síntomas como: irritación y prurito ocular.

TRATAMIENTO

Ya que no existe un antídoto específico, el tratamiento de la sobredosis de aminoglucósidos o de las reacciones tóxicas debe ser sintomático y de mantenimiento.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero con 10 mL de solución oftálmica estéril.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Venta Bajo Receta



Oftalmol

División de INDUFAR CISA

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535



División de INDUFAR CISA
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13