

Oftalmol Aler

Olopatadina 2 mg/mL

Solución Oftálmica Estéril

Antialérgico y Antihistamínico ocular



Vía de Administración: Oftálmica

FÓRMULA

Cada mL de solución oftálmica estéril contiene:

Olopatadina (como HCl).....2 mg
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

OFTALMOL ALER 2 mg/mL es una solución oftálmica estéril que contiene **Olopatadina**, un agente antialérgico que ejerce sus efectos a través de diversos mecanismos de acción:

- Antagonismo selectivo de los receptores histamínicos H1.
- Estabilización de las células cebadas (mastocitos).
- Prevención de la producción de citocina inflamatoria inducida por la histamina que tiene lugar a nivel de las células epiteliales del ojo humano.

INDICACIONES

OFTALMOL ALER 2 mg/mL está indicado especialmente para la prevención de la picazón o comezón ocular que acompaña a la conjuntivitis alérgica. Tratamiento de otros signos y síntomas asociados a padecimientos oculares alérgicos.

POSOLÓGIA

Niños mayores de 3 años, adolescentes y adultos, instilar 1 gota en cada ojo, 1 vez al día.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad comprobada a la **Olopatadina** o a cualquiera de los componentes de la formulación.

REACCIONES ADVERSAS

Se han reportado con mayor frecuencia síntomas parecidos al resfriado tales como: cefalea, dolor de garganta, faringitis y secreción nasal.

Se han informado con menor frecuencia las siguientes reacciones adversas:

Oculares: Ardor o picazón, sequedad, sensación de cuerpo extraño, hiperemia, visión borrosa, queratitis, edema palpebral.

No Oculares: Astenia, alteración del gusto, náuseas, sinusitis.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se deberá advertir a los pacientes que para la administración de OFTALMOL ALER 2 mg/mL es necesario retirar los lentes de contacto y esperar 10 minutos para colocárselos nuevamente. El producto no está indicado para tratar la irritación causada por el uso de lentes de contacto.

Se deberá tener cuidado de no tocar los párpados o áreas circundantes con el pico del gotero del frasco de manera a evitar la contaminación de la solución.

Una vez abierto el frasco, utilizarlo en el plazo de los 28 días siguientes.

INTERACCIONES

No se han reportado hasta la fecha interacciones medicamentosas y alimentarias con OFTALMOL ALER 2 mg/mL.

SOBREDOSIS

No se han informado casos de intoxicación por sobredosisificación o consumo accidental.

TRATAMIENTO

En caso de sospecha de sobredosis tópica, se debe retirar el producto de los ojos con agua tibia corriente.

RESTRICCIONES DE USO

Se deberá evaluar la relación riesgo beneficio para la administración en embarazadas y madres lactantes.

No se recomienda la utilización en pacientes menores de 3 años debido a que no se ha establecido la seguridad y eficacia.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15°C y 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero con 5 mL de solución oftálmica estéril.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".



Oftalmol

División de INDUFAR CISA

Regente: Quim. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13