

Oftalmol Pred

Prednisolona Acetato

10 mg/mL

Suspensión Oftálmica Estéril
Antialérgico - Antiinflamatorio

Vía de Administración: Oftálmica

FÓRMULA

Cada mL de OFTALMOL PRED Suspensión Oftálmica Estéril contiene:

Prednisolona Acetato.....10 mg
Excipientesc.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

La **Prednisolona** es un corticosteroide no fluorado, sintético, con acción 4 a 5 veces más potente que la Hidrocortisona. Su acción se basa, como todos los corticosteroides, en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas.

Después de su aplicación en el globo ocular, la **Prednisolona** es absorbida por la córnea, humor acuoso, iris, cuerpo ciliar, coroides y retina. Se difunde a través de la membrana celular y forma complejos con los receptores citoplasmáticos, los cuales ingresan posteriormente al núcleo celular, produciendo luego la síntesis proteica de las enzimas responsables de los efectos antiinflamatorios de los corticosteroides por aplicación tópica. La absorción sistémica ocurre, pero en cantidades despreciables.

INDICACIONES

Enfermedades inflamatorias no infecciosas de córnea, conjuntiva y segmento anterior del ojo. Conjuntivitis y/o queratoconjuntivitis alérgica. Epiescleritis, escleritis, iritis, ciclitis e iridociclitis. Injurias corneales por quemadura química, dérmica o radiación.

POSOLOGÍA

Dosis recomendada:

Instilar 1 a 2 gotas, de 2 a 4 veces por día.

En casos severos y durante las 24 - 48 horas, instilar 1 a 2 gotas cada hora, disminuyendo gradualmente a medida que va cediendo la inflamación. En caso de utilizar más de una preparación oftálmica, se deberá aplicar después de 5 minutos entre cada aplicación. Agitar bien antes de cada uso.

REACCIONES ADVERSAS

Frecuentes: visión borrosa transitoria.

Poco frecuente: ardor, prurito, elevación de presión intraocular, catarata subcapsular, infección ocular secundaria, alteración de la agudeza visual y defectos del campo visual. Neuropatía óptica.

Raras: perforación del globo ocular.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se debe utilizar con cuidado en pacientes con herpes simple ocular por el peligro de perforación corneal.

Cuando el paciente atraviese una situación de estrés se requiere aumentar la dosis.

CONTRAINDICACIONES

Infecciones oculares purulentas agudas, herpes simple superficial agudo, varicela y muchas otras enfermedades virales de la córnea y conjuntiva, tuberculosis ocular, enfermedades fúngicas del ojo o sensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.

INTERACCIONES

Antiglaucomatosos: puede disminuir la eficacia hipotensora. Anticolinérgicos: mayor riesgo de glaucoma.

Lentes de contacto: mayor riesgo de infección secundaria.

SOBREDOSIS

Sobredosis por ingestión oral accidental de corticosteroides oftálmicos generalmente no produce efectos adversos serios por la baja concentración del principio activo.

TRATAMIENTO

Sintomático y de mantenimiento.

RESTRICCIONES DE USO

Considerar riesgo/beneficio en caso de cataratas, diabetes, glaucoma crónico de ángulo abierto, infecciones de la córnea o conjuntiva.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C. Una vez abierto el frasco utilizarlo en el plazo de los 28 días siguientes.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero x 5 mL de suspensión oftálmica estéril.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

Agitar bien antes de cada uso

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".



Oftalmol
División de INDUFAR CISA
Regente: Quim. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaevedra y
Bella Vista - Frdo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13