

LOI

Levofloxacin 500 - 750 mg

Antibiótico
Antibacteriano sintético de amplio espectro

Comprimidos Recubiertos

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido recubierto de **Loi 500 mg** contiene:

Levofloxacin (como Levofloxacin Hemidrato).....500 mg

Excipientes:

Alcohol Etilico 0,20 mL; Color Amarillo FDC N°5 Lake 0,92 mg; Color Amarillo FDC N°6 Lake 0,18 mg; Propilenglicol 1,84 mg; Otros Excipientes c.s.

Cada comprimido recubierto de **Loi 750 mg** contiene:

Levofloxacin (como Levofloxacin Hemidrato).....750 mg

Excipientes:

Lactosa 7,01 mg; Almidón Glicolato Sódico 70,20 mg; Alcohol Etilico 0,18 mL; FD&C Amarillo N°5 Lake 2,74 mg; Propilenglicol 1,78 mg; Otros Excipientes c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

El **Levofloxacin** es un antibiótico bactericida de amplio espectro de la familia de las quinolonas. El mecanismo de acción involucra la unión de esta droga con la girasa del ácido desoxirribonucleico (DNA), enzima responsable de la replicación, transcripción, reparación y recombinación del DNA.

INDICACIONES

Infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, incluidas sinusitis, neumonía. Infecciones de la piel y tejidos blandos. Infecciones del tracto urinario. Osteomielitis. Artritis séptica. Úlcera de córnea causada por bacterias sensibles al fármaco.

POSOLOGÍA

A criterio del médico.

La dosis de referencia para adultos: 1 comprimido recubierto de 500 mg o 1 comprimido recubierto de 750 mg cada 24 horas.

Puede ser administrado a cualquier hora del día porque los alimentos no interfieren en la absorción del **Levofloxacin**.

Se aconseja administrar 2 horas antes o 2 horas después en pacientes que están tomando antiácidos a base de Aluminio y Magnesio, Sacralfato, sales de Hierro, minerales (zinc).

REACCIONES ADVERSAS

Incluyen diarrea, náuseas, vaginitis, flatulencia, dolor abdominal, prurito, rash, dispepsia, insomnio, visión borrosa, insuficiencia renal aguda, artritis, confusión, convulsiones, depresión, hipoglucemia, pancreatitis, trastornos del sueño, eritema multiforme.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En caso de aparición del rash cutáneo u otro signo de hipersensibilidad, suspender la administración. Evitar la exposición excesiva a la luz del sol por posibles reacciones de fotosensibilidad.

Manejar automóviles o maquinarias con precaución por los efectos neurológicos adversos como somnolencia y delirio provocados por el **Levofloxacin**.

Como no se dispone de estudios adecuados en mujeres embarazadas, se aconseja no administrar durante la gestación, salvo en el caso de que el beneficio para la madre justifique el riesgo potencial para el feto.

De la misma manera, se recomienda no administrar a mujeres en periodo de lactancia por los posibles efectos adversos que puede ocasionar en el niño. Estudios en animales jóvenes demostraron que el **Levofloxacin** produce erosión en las articulaciones que soportan peso y otros signos de artropatía, por lo cual no se aconseja administrarla a niños y adolescentes. La seguridad y eficacia del fármaco no se ha establecido en pacientes pediátricos, adolescentes (18 años) y mujeres embarazadas o durante la lactancia. LOI Comprimidos recubiertos contiene como excipiente Alcohol Etilico 0,25 g por cada

comprimido recubierto lo que puede ser causa de riesgo en niños. También contiene como excipiente Color Amarillo FDC N°5 Lake y Color Amarillo FDC N°6 Lake, pueden causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

LOI 750 mg Comprimidos recubiertos contiene como excipiente Alcohol Etilico 0,23 g por cada comprimido recubierto lo que puede ser causa de riesgo en niños. También contiene como excipiente Lactosa 0,007 g por cada comprimido recubierto lo que debe ser tomado en cuenta en pacientes con problemas de absorción de glucosa o galactosa, galactosemia o insuficiencia de lactosa y FD&C Amarillo N° 5 Lake por cada comprimido recubierto, puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. Además contiene como excipiente Almidón Glicolato Sódico por cada comprimido recubierto. Los enfermos celíacos deben consultar a su médico antes de utilizarlo.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al **Levofloxacin** y a otras quinolonas. Antecedentes de problemas de tendón debido a la administración de fluorquinolonas. Bradicardia significativa. Diabetes mellitus. Hipocalcemia. Función renal deteriorada.

INTERACCIONES

Antiácidos que contengan Calcio, Magnesio o Aluminio, Sacralfato, cationes metálicos como el Hierro y complejos multivitámicos que contengan Zinc, pueden interferir en la absorción gastrointestinal del **Levofloxacin**. La administración concomitante con drogas antiinflamatorias no esteroideas pueden aumentar el riesgo de estimulación del sistema nervioso central y convulsiones.

El **Levofloxacin** eleva los niveles plasmáticos de Teofilina y aumenta el riesgo de reacciones adversas de esta última droga.

SOBREDOSIS

Náuseas, diarrea, flatulencia, dolor abdominal, convulsiones, rash.

TRATAMIENTO

Vaciamiento gástrico.

RESTRICCIONES DE USO

En embarazo, sólo administrar si los beneficios para la madre superan los riesgos potenciales para el feto. No administrar durante el periodo de lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 25° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos de Loi 500 mg.

Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos de Loi 750 mg.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Paraguay: Venta Bajo Receta Simple Archivada
Bolivia: Venta Bajo Receta

Paraguay:

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535