

BRAXAN

Ceftriaxona 1g

Antibiótico Cefalosporínico de Tercera Generación
Polvo para Solución Inyectable

Vía de Administración: Inyectable IM-IV

FÓRMULA

Cada frasco-ampolla contiene:

Ceftriaxona (como sal sódica).....1 g

Cada ampolla de solvente anestésico uso IM contiene:

Lidocaina (como clorhidrato).....40 mg

Excipientes c.s.p.....3,5 mL

Cada ampolla de solvente uso IV contiene:

Agua para Inyección.....10 mL

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Su acción bactericida depende de su capacidad para alcanzar y unirse a las proteínas que ligan penicilina, localizadas en las membranas citoplasmáticas. Las cefalosporinas inhiben la síntesis de la pared celular y del septum bacteriano, por acilación de las transpeptidasas unidas a la membrana. Además, inhiben la división y el crecimiento celulares, con frecuencia se produce la lisis y la elongación de las bacterias sensibles. Las bacterias que se dividen en forma rápida son las más sensibles a la acción de las cefalosporinas. Su unión a las proteínas es muy alta, se metaboliza en el hígado y no se elimina por diálisis.

INDICACIONES

Infecciones del tracto biliar producidas por *Escherichia coli*, especies de *Klebsiella*, *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus*. Infecciones óseas producidas por especies de *Enterobacter*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus* o *Staphylococcus*. Infecciones del SNC por *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*. Infecciones del tracto genitourinario producidas por especies de *Clostridium*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis*, *Proteus mirabilis*, gonorrea, neumonía, sepsis bacteriana, infecciones de piel y tejidos blandos.

POSOLOGÍA

En pacientes con disfunción hepática y renal la dosis diaria no debe superar 2 g.

Dosis para adultos: IM o IV, 1g a 2g cada 24 horas o 500 mg a 1g cada 12 horas.

Infecciones gonocócicas (no complicadas): IM, 250 mg como dosis única.

Profilaxis preoperatoria: IV, 1g 30 minutos a 2 horas antes de la cirugía.

Dosis pediátricas: IM o IV, 25 mg a 37,5 mg/Kg cada 12 horas.

Meningitis: IV, 50 mg/Kg cada 12 horas.

La terapéutica puede iniciarse con una dosis de carga de 75 mg/Kg o sin ella.

REACCIONES ADVERSAS

Son de incidencia rara calambres, dolor y distensión abdominal, diarrea acuosa y grave, fiebre, aumento de la sed, náuseas, vómitos, pérdida de peso no habitual, rash cutáneo, prurito, edema (por hipersensibilidad).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En los pacientes diabéticos pueden producirse reacciones falso positivas para los análisis de glucosa en orina que utilizan sulfato de cobre. Si bien atraviesa la placenta no se han demostrado efectos adversos en el feto. También se excreta en la leche materna, normalmente en bajas concentraciones.

INTERACCIONES

El Probenecid disminuye la secreción tubular renal, lo que da como resultado un aumento y prolongación de las concentraciones séricas de **Ceftriaxona**.

CONTRAINDICACIONES

Se evaluará la relación riesgo-beneficio en pacientes con antecedentes de enfermedad gastrointestinal, en especial colitis ulcerosa y disfunción renal.

SOBREDOSIS

- Hemorragia o hematomas no habituales.
- Colitis pseudomembranosa.
- Disfunción renal.
- Reacciones semejantes a la enfermedad del suero (rash cutáneo, dolor en las articulaciones).

TRATAMIENTO

Reposición de electrolitos, fluidos y proteínas. Tratamiento sintomático y de apoyo.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrar a pacientes con enteritis regional o colitis asociada a antibióticos.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura no mayor a 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 1 frasco-ampolla + 1 ampolla solvente anestésico 1% x 3,5 mL + 1 ampolla de agua destilada x 10 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Paraguay: Venta Bajo Receta Simple Archivada
Bolivia: Venta Bajo Receta

Paraguay:

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13



**LABORATORIOS
INDUFAR**

División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535