

TRICOVAL

Metronidazol

Comprimidos Ranurados 500 mg
Suspensión Oral 250 mg/ 5mL

Antibacteriano - Anaerobida - Tricomónica - Giardicida
Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido ranurado de TRICOVAL ORAL 500 contiene:

Metronidazol.....500 mg

Excipientes.....c.s.

Cada 5 mL de TRICOVAL 250 contiene:

Metronidazol (como Benzoato).....250 mg

Excipientes:

Propilenglicol 125 mg, Sorbitol 1000 mg, Color Amarillo FDC N° 6 0,45 mg;

Otros Excipientes c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

TRICOVAL es un quimioterápico sintético derivado de los nitroimidazoles, activo contra la mayoría de los anaerobios, tricomonas urogenitales, giardias y amebas.

INDICACIONES

Profilaxis y tratamiento de infecciones perioperatorias por anaerobios de cualquier localización, tricomoniasis vaginal y uretral, giardiasis intestinal y extraintestinal, vaginitis por Gardnerella vaginalis, amebiasis, helmintiasis y cualquier proceso infeccioso causado por Bacteroides sp, Clostridium sp, Fusobacterium, Peptococcus sp, Peptostreptococcus sp, Eubacterium, Helicobacter y otros cocos y bacilos anaerobios.

POSOLÓGIA

Tricoval comprimidos ranurados

Como antiparasitario, adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido ranurado por día durante 10 días.

Como antibacteriano, adultos inicialmente 2 comprimidos ranurados y luego 1 comprimido ranurado cada 8 horas, hasta 24 a 48 horas antes de la intervención.

Tricoval suspensión

Como antiparasitario, niños 5 a 10 mL, 3 veces al día, durante 7 días (Ajustar según edad y peso).

Como antibacteriano, niños se recomienda 22,5 mg/kg peso/día repartidos en 3 tomas (1 dosis cada 8 horas) por 10 días.

Tricomonas vaginalis: Una sola toma de 2 g o 250 mg 3 veces al día durante 7 días.

Amebiasis: ADULTOS: 750 mg 3 veces por día durante 5 - 10 días.

NIÑOS: 35 - 50 mg/kg/día dividida en 3 tomas durante 10 días.

Giardiasis: ADULTOS: 250 mg 3 veces por día durante 7 días.

NIÑOS: 5 mg/kg 3 veces por día durante 7 días.

Anaerobios: ADULTOS: 15 mg/kg de peso inicialmente, luego 7,5 mg/kg de peso cada 6 - 8 horas durante 7 - 10 días. NIÑOS: 20 - 30 mg/kg/día repartida en 3 tomas durante 10 días.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran"

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente náuseas, vómitos, diarreas, gusto metálico en la boca, epigastralgia, rash, prurito, urticaria, cefalea, convulsiones, mareos, coloración rojiza de la orina, confusión y alucinaciones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento. La asociación con disulfiram puede

producir estados delirantes o confusionales. No asociar con anticoagulantes. Administrar con cuidado en la insuficiencia hepática severa. Usar con precaución en pacientes con afecciones neurológicas agudas.

Si es preciso alargar el tratamiento se debe realizar determinaciones hematológicas, en especial recuento leucocitario, y vigilar por riesgo de neuropatías central o periférica.

Este medicamento contiene 1 g de Sorbitol como excipientes por cada 5 mL de Suspensión Oral. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con reacciones de tipo alérgico, incluyendo reacciones anafilácticas y broncoespasmo, en pacientes susceptibles especialmente en aquellos con historial asmático o alérgico.

Además contiene color Amarillo FDC N°6 como excipiente y puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al metronidazol, a cualquiera de las drogas pertenecientes al grupo de los imidazoles o a alguno de los excipientes, discrasias sanguíneas, insuficiencia hepática, embarazo, lactancia, afecciones del Sistema Nervioso Central.

INTERACCIONES

Los anticoagulantes potenciarían su efecto. El uso simultáneo con disulfiram debe evitarse ya que produce confusión y reacciones psicóticas. Administrar con alcohol da lugar a calambres abdominales, náuseas y cefaleas.

SOBREDOSIS

Los síntomas por sobredosis pueden ser: mareos o sensación de mareo, dolor de cabeza, calambres o dolor de estómago. Náuseas y vómitos intensos.

TRATAMIENTO

El tratamiento para la sobredosis de Metronidazol debe ser sintomático y de apoyo.

RESTRICCIONES DE USO

Pacientes con sensibilidad a la droga. Insuficiencia hepática embarazo y lactancia.

Antecedentes de discrasias sanguíneas, enfermedad orgánica activa del S.N.C.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

PRESENTACIONES

TRICOVAL Oral 500 Comprimidos ranurados:

Caja contenido 20 comprimidos ranurados

TRICOVAL 250 Suspensión Oral:

Caja Contenido frasco x 100 mL de suspensión oral

Manténgase fuera del alcance de los niños

Paraguay: Venta Bajo Receta Simple Archivada

Bolivia: Venta Bajo Receta

Paraguay:

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. - Teléfono: 220-418".

Importado por: IMFAR S.R.L.

Santa Cruz - Bolivia Teléf. 362-6640

Regente: Dra. Iblin Y. Ledezma C.

Matrícula N°: L-165

Reg. N°: II-51588/2019



Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de INDUFAR CISA
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13