

APIRON

Dipirona

500 mg / mL

Solución Gotas Orales

Analgésico - Antipirético Antirreumático

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada mL contiene:

Dipirona.....500 mg

Excipientes.....C.S.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

APIRON gotas proporciona acción analgésica, anti-inflamatoria, antipirética y antiflogística.

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de los cuadros clínicos que cursan con dolor, con o sin fiebre: cefaleas, dentición dolorosa, odontalgias, neuralgias, neuritis, ciática, lumbalgias, etc. Procesos reumáticos: artritis reumatoidea, osteoartritis o artrosis, fibrositis. Dolores post-traumáticos (cirugía ortopédica). Cólicos biliares, ureterales, vesicales, etc. Resfriados comunes. Fiebre.

POSOLOGÍA

Adultos: 20 a 40 gotas, 3 a 4 veces al día.

Niños: 10 a 25 gotas, 3 a 4 veces al día.

Lactantes: 2 a 6 gotas, 3 a 4 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

APIRON solución gotas orales no debe administrarse en caso de alergia a las pirazonas y en determinadas enfermedades metabólicas (porfiria hepática, déficit congénito de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa).

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas más comunes son las de hipersensibilidad que pueden llegar a producir trastornos hemáticos por mecanismos inmunes, tales como agranulocitosis. Otra reacción esencial de hipersensibilidad es el shock, manifestándose con sudor frío y náuseas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Solo debe utilizarse bajo prescripción médica, durante los tres primeros meses y en las últimas seis semanas del embarazo.

Comunicar al médico si padece de afecciones de las vías respiratorias y en caso de alteraciones previas del sistema hematopoyético.

INTERACCIONES

Se produce disminución de la acción de la Ciclosporina al administrarse con **Dipirona**. Se potencian los efectos de **Dipirona** con la ingestión simultánea de alcohol.

SOBREDOSIS

Dolor abdominal, caída de presión sanguínea, arritmias cardíacas, mareos, somnolencia, convulsiones.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento, realizar lavado de estómago.

RESTRICCIONES DE USO

Administrar con precaución en caso de reacciones de hipersensibilidad ante otros AINES.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura no mayor de 25° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco gotero x 10 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelós. Teléfono: 220-418".



**LABORATORIOS
INDUFAR**

División de **INDUFAR CISA**

Regente: Quim. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13