

MEMOVITAL B₁₂

Jarabe

Estimulante de la memoria y del apetito

Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Vitamina B 12.....	50 mcg
Vitamina B1.....	0,010 g
Glicerofosfato de Magnesio.....	1 g
Glicerofosfato de Sodio.....	2 g
Glicerofosfato de Potasio.....	1 g
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

MEMOVITAL B12 es una activa asociación de vitaminas y minerales de agradable sabor y fácil administración, que actúa como estimulante de la memoria y del apetito.

INDICACIONES

Está indicado en el tratamiento de la fatiga, agotamiento. Estimulante de la memoria y el apetito, astenia, coadyuvante en el tratamiento del alcoholismo crónico, convalecencia, surmenage.

POSOLOGÍA

Niños menores: 2,5 mL, 3 veces al día.

Niños Mayores: 5 mL, 3 veces al día.

Adultos: 10 mL, 3 veces al día.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

1 a 2 semanas, a criterio del médico.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran"

MODO DE EMPLEO

Consumir antes de las principales comidas.

REACCIONES ADVERSAS

Son de incidencia muy rara: rash cutáneo, prurito o sibilancias.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda no utilizar las vitaminas como sustituto de la dieta equilibrada.

Administrar con precaución a pacientes con alteración de la función renal.

INTERACCIONES

El ácido ascórbico puede inactivar la Vitamina B12.

Con el uso simultáneo de alcohol, antibióticos aminoglucósidos y anticonvulsivos (especialmente Fenobarbital) se produce la reducción de los niveles séricos de la Vitamina B12.

Se produce la absorción de la Vitamina B12 al administrarse con Cimetidina y Ranitidina.

SOBREDOSIS

Hinchazón de la cara, labios o párpados, sibilancias, diarrea, prurito en la piel.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles a las drogas presentes en la formulación. Hiperfosfatemias. Enfermedad de Leber.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrar a pacientes sensibles a otras cobalaminas (que se encuentran de forma natural en los alimentos) ya que pueden serlo también a la Vitamina B12 presente en la formulación.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN

Frascos conteniendo 120 mL y 240 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Libre en Farmacias

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.
Teléfono: 220-418".**



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 662 510 al 13