



APIRON

Dipirona 1g/2mL

Inyectable
Analgésico - Antiespasmódico - Antipirético
Vía de Administración: Inyectable IM - IV

FÓRMULA

Cada ampolla de 2 mL contiene:

Dipirona.....1g
Excipientes: Metabisulfito de Sodio 10,00 mg. Otros excipientes c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Proporciona acción analgésica, antiinflamatoria, antipirética y antiespasmódica. Es un derivado pirazolónico que actúa selectivamente sobre el tálamo, disminuyendo la reactividad de los centros nerviosos frente a los excitantes termógeno-dolorosos. Su vida media en el organismo es de 7 horas y se excreta por vía urinaria como metabolitos. Actúa también como inhibidor selectivo de las prostaglandinas F₂, Alfa.

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento sintomático de los cuadros clínicos dolorosos que cursan con o sin fiebre, cefaleas, jaquecas, odontalgias, neuralgias, neuritis, ciática, lumbalgias, etc.
Dolores post-traumáticos y post-quirúrgicos, cólicos biliares, uterinos, ureterales, vesicales, etc.

POSOLOGÍA

En administración intramuscular o intravenosa:

Adultos: 2 a 3 ampollas al día.

Niños: 1/2 a 2 ampollas diarias.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran".

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad a las pirazolonas. Pacientes que presenten determinadas enfermedades metabólicas (porfiria hepática, déficit congénito de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa).

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones más comunes son las de hipersensibilidad que puede llegar a producir trastornos hemáticos por mecanismos inmunes, tales como agranulocitosis. Otra reacción esencial de hipersensibilidad es el shock, manifestándose con prurito, sudor frío y náuseas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Con la administración de esta droga los pacientes que padecen asma bronquial o afecciones crónicas de las vías respiratorias y los afectados por reacciones de hipersensibilidad, están expuestos a posibles reacciones anafilactoides. Deberá tenerse cuidado al administrarse durante el primer trimestre del embarazo y en sus últimas semanas. Solo se deberá aplicar con la prescripción del médico en lactantes y niños pequeños.

Este medicamento contiene 0,01 g de Metabisulfito de Sodio como excipiente por 2 mL pudiendo causar, molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con reacciones de tipo alérgico, incluyendo reacciones anafilácticas y broncoespasmo en pacientes susceptibles especialmente en aquellos con historial asmático o alérgico.

INTERACCIONES

Se produce disminución de la acción de la Ciclosporina al administrarse con **Dipirona**. Se potencian los efectos del **Dipirona** con la ingestión simultánea de alcohol.

SOBREDOSIS

Dolor abdominal.
Caída de la presión sanguínea.
Arritmias cardíacas.
Mareos, somnolencia, convulsiones.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento. El metabolito principal (4 - N - metilaminoantipirina) puede ser eliminado por hemodíalisis, hemofiltración, hemoperfusión o filtración plasmática.

RESTRICCIONES DE USO

No se recomienda el uso del producto durante el embarazo y la lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30 °C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 5 ampollas x 2 mL de solución inyectable.
Caja conteniendo 100 ampollas x 2 mL de solución inyectable.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

Paraguay:

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



**LABORATORIOS
INDUFAR**
División de INDUFAR CISA
Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13