

# Ultrason

# Miconazol

Crema

**Antimicótico - Antiinflamatorio - Antialérgico**

Vía de Administración: Tópica

## FÓRMULA

Cada gramo contiene:

Betametasona (como 17-Valerato).....1 mg  
Miconazol nitrato.....20 mg  
Excipientes.....c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

ULTRASON MICONAZOL CREMA es una asociación farmacológica con sumo grado de efectividad por la acción sumatoria de sus elementos constitutivos. Brinda actividad antialérgica, antiinflamatoria, antiprurítica y antimicótica.

## INDICACIONES

Está indicado en el tratamiento de las manifestaciones alérgicas, inflamatorias y pruriginosas de la piel, cuando exista infección micótica.

## POSOLOGÍA

Aplíquese una delgada capa de ULTRASON MICONAZOL CREMA en las zonas afectadas, 2 a 3 veces al día, frotando suavemente para una mejor absorción por la piel.

## CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles a las drogas presentes en la formulación. Tuberculosis cutánea. Lesiones de sífilis, varicela y vacunas.

## REACCIONES ADVERSAS

Rash cutáneo, formación de ampollas, escozor, enrojecimiento o algún otro signo de irritación cutánea ausente antes del tratamiento.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe utilizarse en zonas extensas, en grandes cantidades ni durante períodos prolongados en pacientes embarazadas o que proyecten quedarse embarazadas. No aplicarse en las mamas antes de amamantar. Evitar su aplicación a pacientes con heridas profundas, quemaduras graves y zonas en carne viva.

## INTERACCIONES

No se han registrado interacciones por vía tópica de la **Beta metasona** y **Miconazol**.

## SOBREDOSIS

Hinchazón, enrojecimiento, escozor.

## TRATAMIENTO

Puesto que no se dispone de un antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento, incluyendo la suspensión de la medicación.

## RESTRICCIONES DE USO

Evitar el uso de este medicamento durante el primer trimestre de embarazo. Las mujeres en periodo de lactancia no deben tratarse las mamas con este medicamento.

## CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25°C. Variación admitida entre 15°C y 30°C.

## PRESENTACIÓN

Pomo conteniendo 20 gramos.

Manténgase fuera del alcance de los niños  
Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

**MEDICAL**

Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13