

# TRINALER

Aciclovir 0,05 g/1 g

Crema  
Antivírico  
V.a.: Tópica

## FÓRMULA

Cada 1 g de crema contiene:

Aciclovir.....0,05 g  
Excipientes.....c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

El **Aciclovir**, derivado de la purina, es un agente antivírico eficaz para el tratamiento tanto por vía oral como tópica de las lesiones causadas por los Herpes-virus.

El **Aciclovir** es convertido en un nucleótido, el **Aciclovir** monofosfato, por la timidina quinasa codificada por el virus del Herpes simple (VHS). La guanilato quinasa celular convierte el **Aciclovir** monofosfato en **Aciclovir** difosfato y varias enzimas celulares lo transforman a trifosfato. El **Aciclovir** trifosfato interfiere en la acción de la ADN polimerasa de VHS e inhibe la replicación de ADN viral. El trifosfato puede ser incorporado por la ADN polimerasa de VHS e inhibe la replicación de ADN viral. El trifosfato puede ser incorporado por la ADN polimerasa viral a las cadenas de ADN en crecimiento, dando lugar a la terminación de la cadena de ADN. Como el **Aciclovir** es captado preferentemente por las células infectadas por el virus de Herpes simple, que lo convierten selectivamente en trifosfato activo, resulta mucho menos tóxico para las células normales no infectadas.

Su absorción en piel intacta es mínima mientras que en piel enferma (Herpes zóster) es moderada. Su eliminación es renal, hasta el 9% aproximadamente de la dosis diaria se puede excretar en la orina.

## INDICACIONES

TRINALER CREMA está indicado para el tratamiento de las infecciones de la piel causadas por el virus Herpes simple como: Herpes genital, Herpes labial, inicial y recurrente.

## POSOLOGÍA

**Adultos y niños:** Aplicar TRINALER CREMA en la zona afectada 5 veces al día durante 5 días (aproximadamente cada 4 horas), omitiendo las aplicaciones durante la noche. Si el tratamiento no es satisfactorio, continuar por 5 días más. Es importante el tratamiento sobre las lesiones inminentes. Si las lesiones están establecidas iniciar el tratamiento lo antes posible. El tratamiento en los episodios recurrentes debe hacerse en el periodo prodromico o cuando las lesiones aparecen por primera vez.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

TRINALER CREMA no debe aplicarse sobre las mucosas como boca, ojos, vagina, porque puede causar irritación. A las dosis terapéuticas, no se han comprobado en animales efectos teratogénicos, carcinogénicos, sobre la fertilidad, lactancia o embarazo. Sin embargo se aconseja utilizar bajo vigilancia médica durante el embarazo para prevenir riesgos desconocidos.

## REACCIONES ADVERSAS

En algunos pacientes se ha presentado ardor transitorio, pequeñas descamaciones. Muy raras veces puede presentarse eritema o prurito.

## CONTRAINDICACIONES

Pacientes sensibles al **Aciclovir** tópico. Embarazo.

## INTERACCIONES

La administración conjunta con Probenecid aumenta la vida media del **Aciclovir**, reduciendo su clearance renal.

## SOBREDOSIS

No se conocen casos de sobredosis con **Aciclovir** vía tópica.

## RESTRICCIONES DE USO

Deberá evaluarse la relación riesgo beneficio al administrar a pacientes con alteraciones de la función renal, así como pacientes con antecedentes de alteraciones neurológicas relacionadas con un citotóxico.

## CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

## PRESENTACIÓN

Caja conteniendo pomos con 10 g.

Manténgase Fuera Del Alcance De Los Niños  
Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**  
Planta industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: indufar@indufar.com.py  
P. web: www.indufar.com.py  
Teléfonos: 682 510 al 13