

RIFAMICINA SV 1% INDUFAR

Solución Spray

Antibiótico tópico

Vía de administración: Tópica

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Rifamicina SV (como sal sódica)..... 1 g

Excipientes..... c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

RIFAMICINA SV 1% INDUFAR solución spray contiene en su fórmula a la **Rifamicina SV** un antibiótico semisintético perteneciente al grupo de las **Rifamicinas**, de uso tópico. Ejerce su acción bactericida por inhibición de la síntesis de ácido ribonucleico mensajero, necesario para el inicio de la síntesis proteica normal a través de ADN (inhibición de la enzima ARN polimerasa).

INDICACIONES

Tratamiento y profilaxis tópica de las infecciones cutáneas: quemaduras, forúnculos, piodermis, dermatosis infectadas, heridas infectadas, úlceras (varicosas, post-flebíticas, ateroscleróticas y diabéticas), dermatitis ecematoide, curaciones de heridas post-quirúrgicas infectadas.

POSOLOGÍA

Aplicar pulverizaciones sobre la zona afectada cada 6 a 8 horas, o de acuerdo a mejor criterio médico. Debe realizarse una limpieza previa a su uso en heridas sucias. Cubrir las lesiones, con gasa estéril después de cada aplicación, en los casos en que el médico lo haya indicado.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las **Rifamicinas**.

REACCIONES ADVERSAS

La aplicación tópica de RIFAMICINA SV 1% INDUFAR es generalmente bien tolerada. En raros casos pueden presentarse manifestaciones alérgicas cutáneas que se revierten con la suspensión del medicamento y con tratamiento sintomático.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El uso tópico prolongado puede ocasionar sensibilización y sobreinfección.

Evitar la aplicación sobre áreas extensas. Utilizar con precaución en pacientes con ictericia.

INTERACCIONES

La **Rifamicina** interactúa con Ciclosporina. Los pacientes tratados con anticonceptivos hormonales orales u otros deben ser advertidos de cambiar a un método no hormonal, ya que estos interactúan con la **Rifamicina**.

SOBREDOSIS

No se han reportado casos en los que haya habido sobredosis debido a la escasa absorción sistémica.

TRATAMIENTO

Por ingestión accidental el médico decidirá de acuerdo a la evaluación clínica del paciente:

Tratamiento sintomático y de soporte.

Vómito provocado o lavado gástrico.

Administración de carbón activado.

Administración de purgante salino (45 a 60 minutos después del carbón activado)

Hemodiálisis.

RESTRICCIONES DE USO

En el embarazo el médico debe balancear los beneficios de la droga con los riesgos potenciales para la madre y el feto.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco pulverizador x 30 mL de solución.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13