

FLAVORAS RELAX

Extracto Seco Tilo - Extracto Seco Pasiflora
Extracto Seco Valeriana - Ciclobenzaprina
Comprimidos Recubiertos
Tranquilizante Natural
Vía de Administración: Oral

FÓRMULA

Cada comprimido recubierto contiene:

Extracto seco de Tilo.....	75 mg
Extracto seco de Pasiflora.....	75 mg
Extracto seco de Valeriana.....	50 mg
Ciclobenzaprina HCl.....	5 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

FLAVORAS RELAX es un tranquilizante natural, que contiene los extractos desecados de **Tilo** (*Tilia platyphyllos*), **Pasiflora** (*Passiflora incarnata*) y **Valeriana** (*Valeriana officinalis*) que poseen en conjunto una excelente actividad sedante, ansiolítica, antiespasmódica y calmante de la excitación nerviosa, sin efectos secundarios desagradables. No produce acostumbamiento.

La presencia de la **Ciclobenzaprina** le confiere acción relajante del músculo estriado esquelético sin interferir con la función muscular. La **Ciclobenzaprina** relaja la contractura y disminuye el tono del músculo esquelético por acción sobre los sistemas motores (gamma) y (alfa) a nivel del SNC. La **Ciclobenzaprina** es bien absorbida, circula estrechamente unida a las proteínas plasmáticas, se metaboliza primariamente en hígado y su excreción tiene predominio renal. La eliminación es lenta y variable, su vida media oscila entre 1 y 3 días.

INDICACIONES

FLAVORAS RELAX está indicado para el alivio de los cuadros de estrés, ansiedad, nerviosismo, hiperexcitabilidad, trastornos del sueño de origen nervioso, espasmos gastrointestinales, taquicardia, en los cuales coexisten tensión y contractura, en los que se desea una acción sedante suave y de relajación.

POSOLOGÍA

A criterio del médico. La dosis de referencia es:

Adultos: 1 o 2 comprimidos 2 a 3 veces al día.

Niños mayores de 10 años: Según criterio médico.

Los comprimidos recubiertos se administrarán preferentemente después del almuerzo y de la cena.

REACCIONES ADVERSAS

En raros casos pueden presentarse somnolencia, sequedad bucal, mareo, náuseas, reacciones gastrointestinales o alérgicas que desaparecen al suspender el tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe ser administrado a mujeres embarazadas o en lactancia sin prescripción médica.

Por la presencia de la **Ciclobenzaprina**, químicamente relacionada con los antidepressivos tricíclicos y los parasimpaticolíticos, debe ser utilizado con cuidado en pacientes con antecedentes de retención urinaria, glaucoma de ángulo estrecho, aumento de la presión intraocular o en tratamiento con medicación anticolinérgica. Administrar con precaución en pacientes con infarto agudo de miocardio, trastornos del ritmo cardíaco, hipertiroidismo.

La **Ciclobenzaprina** y el extracto seco de Valeriana pueden disminuir la

capacidad mental o física requerida para realizar tareas riesgosas (operar maquinarias, conducir vehículos, etc.)

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la formulación. Embarazo. Por la presencia de la **Ciclobenzaprina**, se contraíndica durante el tratamiento con IMAO hasta 2 semanas después de su suspensión.

INTERACCIONES

Si está en tratamiento con algún otro medicamento sedante, tranquilizante o para dormir, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Por la presencia de la **Ciclobenzaprina**, la interacción con IMAO puede ocasionar crisis de hipertermia, convulsiones. Es teóricamente posible el bloqueo del efecto antihipertensivo de la Guanetidina y los congéneros cuando se administran concomitantemente.

SOBREDOSIS

Por la presencia de **Ciclobenzaprina** se puede presentar confusión temporaria, alucinaciones visuales transitorias, agitación, hiperreflexia, rigidez muscular, vómitos, hiperpírexia, hipotermia, taquicardia, bloqueo de rama o insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias. Se puede así mismo presentar midriasis, convulsiones, hipotensión severa, estupor y coma en adición a los efectos adversos ya descritos.

TRATAMIENTO

Evacuación gástrica (emesis o lavado), administración de carbón activado, control clínico estricto (especialmente gatroduodenal, de la función renal y cardiovascular) y tratamiento sintomático de soporte. El Salicilato de Fisostigmina endovenoso en dosis de 1 a 3 mg puede revertir los síntomas de intoxicación con Antropina u otras drogas anticolinérgicas, en consecuencia podría ser teóricamente de utilidad en la sobredosis de **Ciclobenzaprina**. Las arritmias pueden tratarse con Neostigmina, Piridostigmina o Propanolol, pudiendo ser necesario el uso de digitálicos de acción corta. El monitoreo cardíaco estrecho no debería ser inferior a cinco días.

RESTRICCIONES DE USO

Embarazo y Lactancia.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30°C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Manténgase fuera del alcance de los Niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Gímenez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".

División de **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13

**LABORATORIOS**
INDUFAR
División de INDUFAR CISA
Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535