



# PECTOFAR

## Jarabe

**Expectorante - Broncodilatador  
Antitusivo - Antialérgico**

**Vía de Administración: Oral**

### FÓRMULA

Cada 5 mL contiene:

Gliceril Guayacol Éter.....	100 mg
Clorfeniramina Maleato.....	2,1 mg
Teofilina Anhidra.....	27,5 mg

Excipientes:

Glicerina Anhidra 200 mg; Alcohol Etilico 0,05 mL; Otros Excipientes c.s.

### ACCIÓN FARMACOLÓGICA

PECTOFAR Jarabe es una asociación medicamentosa que contiene en su fórmula a la Teofilina, el Gliceril Guayacol Éter y la Clorfeniramina Maleato. La asociación de Teofilina y Gliceril Guayacol Éter está indicada para aliviar y/o prevenir los síntomas del asma bronquial y del broncoespasmo reversible asociados a bronquitis y enfisema pulmonar crónicos. La Clorfeniramina (antihistamínico de los receptores H1) es eficaz en la rinitis alérgica y vasomotora, conjuntivitis alérgica, urticaria leve, angioedema, reacciones alérgicas a la sangre y plasma en pacientes sensibles. Tiene una baja incidencia de efectos colaterales, que son similares a los inducidos por otros antihistamínicos.

### INDICACIONES

PECTOFAR Jarabe está indicado para aliviar la sensación de la falta de aire, las sibilancias y la disnea asociadas al asma y mejora la función pulmonar. Como expectorante, para el alivio sintomático de la tos debida a resfriados y a infecciones menores de las vías respiratorias superiores. También en la rinitis alérgica perenne y estacional o rinitis vasomotora.

### DOSIS

Adultos: 15 mL 3 - 4 veces al día.

Niños mayores: 5 mL 3 - 4 veces al día.

Niños menores: 2,5 mL 3 - 4 veces al día.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La Teofilina debe ser utilizada con cuidado en pacientes con arritmias preexistentes (la situación puede exacerbarse). En casos de insuficiencia cardíaca (las xantinas son potencialmente cardiotoxicas). En gastritis activa, úlcera péptica activa, lesión miocárdica aguda, hipertrofia prostática (puede aparecer retención urinaria). En enfermedad hepática y en presencia de hipertiroidismo puede aumentar el aclaramiento plasmático. Tener precaución si se produce somnolencia. En caso de irritación gástrica puede tomarse con alimentos, agua o leche. Puede inhibir la lactancia por sus efectos antimuscarínicos.

Evitar la ingestión de alcohol u otros depresores del SNC. No se recomienda su uso en recién nacidos ni en nacidos a pretérmino. En niños mayores puede producirse una reacción paradójica caracterizada por hiperexcitabilidad. En pacientes de edad avanzada es muy probable que aparezcan mareos, sedación, confusión e hipotensión ya que son más sensibles a los efectos antimuscarínicos (sequedad de boca y retención urinaria). Se recomienda controlar las concentraciones séricas de Teofilina, en especial con el uso prolongado o en dosis mayores que las habituales, debido a las variaciones entre los pacientes en la dosificación requerida para conseguir una concentración sérica terapéutica. Con la Clorfeniramina existe una posible interferencia con las pruebas cutáneas que utilizan alérgenos. Puede enmascarar los efectos ototóxicos producidos por dosis elevadas de salicilatos.

Este medicamento contiene Glicerina Anhidra como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estomago y diarrea. Además contiene 0,06g de Alcohol Etilico por cada 5 mL de jarabe lo que puede ser causa de riesgos en niños.

### REACCIONES ADVERSAS

Náuseas, vómitos, diarrea, diuresis aumentada, somnolencia, cefalea y nerviosismo. Taquicardia sinusal, extrasístoles aisladas y crisis convulsivas.

### INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

El uso simultáneo de bloqueantes beta-adrenérgicos con Teofilina puede originar una mutua inhibición de los efectos terapéuticos, además, el uso simultáneo con las xantinas puede disminuir el aclaramiento de Teofilina, especialmente en pacientes con aumento del aclaramiento de Teofilina inducido por el hábito de fumar, el uso simultáneo requiere un control cuidadoso. El uso simultáneo de Cimetidina o Eritromicina o Ranitidina o Troleandomicina con Teofilina puede disminuir el aclaramiento hepático de Teofilina originando un aumento de las concentraciones séricas de Teofilina. El uso simultáneo de medicamentos que producen estimulación del SNC con las xantinas puede originar una estimulación del SNC hasta niveles excesivos, lo que puede producir efectos no deseados, tales como nerviosismo, irritabilidad, insomnio o posibles crisis convulsivas o arritmias cardíacas. El fumar tabaco o marihuana con el uso simultáneo de las xantinas, induce el metabolismo hepático de las xantinas originando un aumento en el aclaramiento de Teofilina y una disminución de las concentraciones séricas de Teofilina. Los fumadores pueden necesitar un aumento en la dosificación del 50 al 100 %. El uso simultáneo de Cafeína u otras xantinas con Teofilina puede aumentar el potencial de efectos secundarios tóxicos. En cuanto al Gliceril Guayacol Éter no se han descrito hasta el momento interacciones con otros medicamentos. El uso simultáneo de alcohol o medicamentos que producen depresión del SNC con Clorfeniramina puede potenciar los efectos depresores sobre el SNC de estos medicamentos o de los antihistamínicos. Con el uso simultáneo de anticolinérgicos u otros medicamentos con acción anticolinérgica con Clorfeniramina pueden potenciarse los efectos anticolinérgicos. El uso simultáneo de los IMAO con la Clorfeniramina puede prolongar e intensificar los efectos anticolinérgicos y depresores del SNC de los antihistamínicos. El uso simultáneo de medicamentos ototóxicos con antihistamínicos puede enmascarar los síntomas de ototoxicidad, como zumbido de oídos, mareos o vértigo.

### CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles a las drogas presentes en la formulación. Embarazo y lactancia.

### INCOMPATIBILIDADES

No se han reportado.

### SOBREDOSIS

Se observan síntomas como: latidos cardíacos rápidos, aumento de sudoración, mareos, dolor de estómago, sequedad de boca, nariz o garganta, respiración dificultosa.

### TRATAMIENTO DE SOBREDOSIS

Realizar lavado gástrico, con solución de cloruro de sodio isotónico.

No administrar estimulantes ya que pueden producir crisis convulsivas.

### CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

### PRESENTACIÓN

Frascos conteniendo 100 mL de jarabe.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

**Para: IMFAR S.R.L.**

Santa Cruz - Bolivia,

Teléf. 362-6640

Regente: Dra. Iblin Y. Ledezma C.

Matrícula N°: L-165

Reg. N°: II-69070/2019

**Fabricado por:**

**LABORATORIOS INDUFAR**



**LABORATORIOS  
INDUFAR**

División de INDUFAR CISA

Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de INDUFAR CISA

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py

Teléfonos: 682 510 al 13