

causar reacciones alérgicas. Debería contactar con su médico inmediatamente si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas después de tomar sildenafil: silbido repentino al respirar, dificultad para respirar o mareos, hinchazón de los párpados, cara, labios o garganta.

Se han notificado casos de erecciones prolongadas y a veces dolorosas después de tomar sildenafil. Si usted tiene una erección que dura más de 4 horas, debe contactar con su médico inmediatamente.

Si experimenta una disminución o pérdida repentina de la visión, deje de tomar sildenafil y contacte con su médico inmediatamente.

El efecto adverso más frecuente (en 1 de cada 10 pacientes) es el dolor de cabeza.

Los efectos adversos frecuentes (entre 1 y 10 de cada 100 pacientes) incluyen: enrojecimiento facial, indigestión, efectos sobre la visión (incluyendo percepción anormal del color, sensibilidad a la luz o visión borrosa o disminución de la agudeza visual), congestión nasal y mareos.

Efectos adversos poco frecuentes (entre 1 y 10 de cada 1000 pacientes) incluyen: vómitos, erupciones cutáneas, sangrado en la parte posterior del ojo, irritación ocular, derrame ocular/ojos rojos, dolor ocular, visión doble, sensación anormal en el ojo, ojo lloroso, sangrado del pene, presencia de sangre en el semen y/o en la orina, latido cardíaco irregular o rápido, dolor muscular, sensación de somnolencia, sensación al tacto reducido, vértigo, pitidos en los oídos, náuseas, boca seca, dolor en el pecho y sensación de cansancio.

Efectos adversos raros (entre 1 y 10 de cada 10000 pacientes) incluyen: presión arterial alta, presión arterial baja, desvanecimiento, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, sangrado de la nariz y disminución o pérdida repentina de la audición.

Los efectos adversos notificados de la experiencia post-comercialización incluyen: palpitaciones, dolor de pecho, muerte súbita o disminución transitoria del flujo sanguíneo a algunas partes del cerebro. La mayoría, pero no todos ellos, tenían problemas cardíacos antes de tomar este medicamento.

No es posible determinar si estos acontecimientos estuvieron relacionados directamente con Sildenafil. También se han notificado casos de convulsiones o crisis y reacciones graves de la piel que cursan con erupción, ampollas, descamación de la piel y dolor que requiere asistencia médica inmediata.

Nota: Consultar al médico o farmacéutico para cualquier aclaración sobre la utilización del producto.

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Perú: Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

Bolivia: Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C)

6. INFORMACIÓN SOBRE LA FECHA DE EXPIRACIÓN

El medicamento no se debe utilizar después de la fecha de vencimiento que indica el envase.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 2 blisters por 5 comprimidos recubiertos.

Caja conteniendo 10 blisters por 1 comprimido recubierto.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Fabricado por:
INDUFAR CISA
Planta industrial y distribución:
Calle Anahi e/ Zaavedra y
Bella Vista - Zona Norte
Fndo. de la Mora - Paraguay
Tel.: 682 510 al 13
e-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py

Para: **IMFAR S.R.L.**
Santa Cruz - Bolivia
Teléf. 362-6640
Reg.: Dra. Iblin Y. Ledezma C.
Matric. N°: L-165
Reg. N°: II-85942/2023
Importado por:
**DROGUERIAS UNIDAS
DEL PERÚ S.A.C.**



Procops 100

Sildenafil 100 mg

Comprimido Recubierto

FÓRMULA

Cada comprimido recubierto contiene:

Sildenafil (como Sildenafil citrato 140,48 mg).....100 mg

Excipientes.....c.s.p.

Excipientes: Lactosa monohidrato 489,52 mg; Almidón de maíz 100,00 mg; Alcohol etílico 0,263 mg; Povidona K-30 26,56 mg; Almidón glicolato de sodio 33,20 mg; Dióxido de silicio coloidal 8,30 mg; Estearato de magnesio 20,76 mg; Agua purificada 0,122 mL; Dióxido de titanio 4,17 mg; FD&C color azul brillante N° 1 lake 0,786 mg; Crospovidona 5,59 mg; Polietilenglicol 1,77 mg; Etilcelulosa 0,38 mg; Hipromelosa 2910 7,62 mg; Otros excipientes c.s.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas, ya que puede perjudicarles.

- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. ¿Qué es Procops 100 mg comprimido recubierto y para qué se utiliza?
2. Antes de tomar Procops 100 mg comprimido recubierto
3. ¿Cómo Tomar Procops 100 mg comprimido recubierto?
4. Posibles efectos adversos
5. Condiciones de Almacenamiento
6. Información sobre la Fecha de Expiración

1. ¿Qué es Procops 100 mg comprimido recubierto y para qué se utiliza?

Procops 100 mg comprimido recubierto pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Actúa dilatando los vasos sanguíneos del pene, permitiendo la afluencia de sangre cuando se está sexualmente estimulado.

Procops 100 mg comprimido recubierto sólo le ayudará a conseguir una erección si se encuentra sexualmente estimulado.

No debe tomar Procops 100 mg comprimido recubierto si no tiene disfunción eréctil. El uso de Procops 100 mg comprimido recubierto no está indicado en mujeres.

Procops 100 mg comprimido recubierto está indicado en el tratamiento de la disfunción eréctil masculina, a veces denominada impotencia. Esto sucede cuando un varón no puede obtener o mantener una erección firme, adecuada para una actividad sexual satisfactoria.

2. Antes de tomar Procops 100 mg comprimido recubierto

• **No tome Procops 100 mg comprimido recubierto**

- Si es alérgico (hipersensible) a sildenafil o a cualquiera de los demás componentes de Procops 100 mg comprimido recubierto.

- Si está tomando medicamentos llamados nitratos, ya que la combinación puede causar una disminución de su presión sanguínea potencialmente peligrosa. Consulte a su médico si está tomando cualquiera de estos medicamentos, que a menudo, se

administran para aliviar el dolor de angina de pecho (o "dolor de pecho"). Si no está seguro, consulte con su médico o farmacéutico.

- Si está utilizando cualquiera de los medicamentos denominados dadores de óxido nítrico tales como nitrato de amilo ("poppers"), ya que la combinación puede causar una disminución de su presión sanguínea potencialmente peligrosa.

- Si tiene un problema grave de corazón o hígado.

- Si ha padecido recientemente un accidente isquémico cerebral, infarto cerebral o ataque al corazón, o si tiene la tensión arterial baja.

- Si padece una rara enfermedad ocular hereditaria (tal como retinitis pigmentosa).

- Si ha experimentado anteriormente una pérdida de la visión debido a una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIA-NA) (enfermedad del nervio óptico).

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran".

• Tenga especial cuidado con Procops 100 mg comprimido recubierto

Informe a su médico:

- Si padece anemia falciforme (una anomalía de los glóbulos rojos), leucemia (cáncer de las células sanguíneas), mieloma múltiple (cáncer de médula ósea).

- Si padece una deformidad del pene o enfermedad de Peyronie.

- Si padece problemas del corazón. En ese caso, su médico debe comprobar cuidadosamente si su corazón puede soportar el esfuerzo adicional de mantener relaciones sexuales.

- Si padece actualmente úlcera de estómago o alteraciones hemorrágicas (tales como hemofilia).

- Si experimenta una disminución o pérdida repentina de la visión, deje de tomar Procops 100 mg comprimido recubierto y contacte con su médico inmediatamente.

No se aconseja utilizar sildenafil simultáneamente con ningún otro tratamiento para la disfunción eréctil.

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

• Uso en niños y adolescentes

El uso de Procops 100 mg comprimido recubierto no está indicado en personas menores de 18 años.

• Uso en pacientes con alteraciones renales o problemas hepáticos

Debe comunicar a su médico si tiene problemas renales o hepáticos. Su médico puede decidir reducirle la dosis.

• Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

Los comprimidos de Procops 100 mg comprimido recubierto pueden interferir con algunos medicamentos, especialmente los utilizados para tratar el dolor de pecho.

En caso de urgencia médica, debe informar a cualquier profesional sanitario que está tomando Procops 100 mg comprimido recubierto y cuando lo tomó.

No debe tomar Procops 100 mg comprimido recubierto con otros medicamentos a menos que su médico se lo aconseje.

No debe tomar Procops 100 mg comprimido recubierto si está tomando medicamentos denominados nitratos, ya que la combinación de estos productos puede causar un descenso potencialmente peligroso de su presión sanguínea. Siempre informe a su médico o farmacéutico si está tomando cualquiera de estos medicamentos, que a menudo, se utilizan para aliviar el dolor de angina de pecho (o "dolor de pecho").

No debe tomar Procops 100 mg comprimido recubierto si está tomando medicamentos denominados dadores de óxido nítrico tales como nitrato de amilo ("poppers"), ya que la combinación de estos también puede dar lugar a un descenso de su presión sanguínea potencialmente peligroso.

Si está tomando medicamentos conocidos como inhibidores de la proteasa, como los utilizados en el tratamiento del VIH, su médico puede recomendarle que comience el tratamiento con la dosis más baja (25 mg) de Procops 100 mg comprimido recubierto.

Algunos pacientes que están recibiendo un alfabloqueante, medicamento utilizado para el tratamiento de la presión arterial alta o de la hipertrofia prostática, pueden experimentar mareos o sensación de vahido que pueden ser causados por una disminución de la tensión arterial al sentarse o levantarse rápidamente. Algunos pacientes han experimentado estos síntomas al tomar sildenafil con

alfabloqueantes. Esto es más probable que ocurra en las 4 horas siguientes a la toma de sildenafil. Con el fin de disminuir la probabilidad de que ocurran estos síntomas, deberá estar recibiendo su dosis diaria de alfabloqueantes de forma regular antes de comenzar con Procops 100 mg comprimido recubierto. Su médico puede indicarle que comience el tratamiento con la dosis inferior (25 mg) de Procops 100 mg comprimido recubierto.

Toma de Procops 100 mg comprimido recubierto con los alimentos y bebidas

Procops 100 mg comprimido recubierto puede tomarse con o sin alimentos. Sin embargo, puede notar que Procops 100 mg comprimido recubierto tarde un poco más en hacer efecto si se ingiere con una comida copiosa.

La ingesta de alcohol puede dificultar, temporalmente, la capacidad para obtener una erección.

Por lo tanto, para conseguir el máximo beneficio del medicamento, se aconseja no ingerir grandes cantidades de alcohol antes de tomar Procops 100 mg comprimido recubierto.

Embarazo y lactancia

El uso de Procops 100 mg comprimido recubierto no está indicado en mujeres.

Conducción y uso de máquinas

Procops 100 mg comprimido recubierto puede producir mareos y afectar a la visión. Debe saber cómo reacciona usted a Procops 100 mg comprimido recubierto antes de conducir vehículos o utilizar maquinaria.

3. ¿Cómo tomar Procops 100 mg comprimido recubierto?

Siga exactamente las instrucciones de administración de Procops 100 mg comprimido recubierto indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. La dosis normal de inicio es 50 mg.

No se debe tomar Procops 100 mg comprimido recubierto más de una vez al día.

Debe tomar Procops 100 mg comprimido recubierto aproximadamente una hora antes de que planea tener relaciones sexuales.

Trague el comprimido entero con un vaso de agua.

Si estima que la acción de Procops 100 mg comprimido recubierto es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Procops 100 mg comprimido recubierto sólo le ayudará a conseguir una erección si se encuentra sexualmente estimulado. El tiempo que necesita Procops 100 mg comprimido recubierto para hacer efecto varía de una persona a otra, generalmente oscila entre media hora y una hora. El efecto de Procops 100 mg comprimido recubierto puede retrasarse si lo toma con una comida excesiva.

En el caso de que Procops 100 mg comprimido recubierto no le ayude a conseguir una erección o si la erección no se mantiene el tiempo suficiente para completar el acto sexual, consulte a su médico.

Si toma más Procops 100 mg comprimido recubierto del que debiera

Puede experimentar un incremento de los efectos secundarios y su gravedad. Dosis superiores a 100 mg no aumentan la eficacia.

No debe tomar más comprimidos de los recomendados por el médico.

Contacte con su médico si ha tomado más comprimidos de los aconsejados.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Procops 100 mg comprimido recubierto puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los efectos adversos notificados asociados al uso de sildenafil son por lo general de intensidad leve a moderada y de corta duración.

Si usted sufre dolores de pecho durante o después de mantener relaciones sexuales:

- Sitúese en una posición semisentado e intente relajarse

- **No use nitratos** para tratar su dolor en el pecho

- Contacte con su médico inmediatamente

Todos los medicamentos incluyendo Procops 100 mg comprimido recubierto pueden